

ALGIZID W

Preparat do usuwania
glonów i grzybów,
przeznaczony
do wnętrz



Główne zalety:

- Skutecznie usuwa większość występujących w budownictwie glonów i grzybów;
- Posiada szeroki zakres działania;
- Łatwy w aplikacji;
- Bezpieczny w stosowaniu.

Zastosowanie:

Preparat przeznaczony do renowacji zagrzybionych powierzchni (grzyby pleśniowe), występujących wewnątrz budynków. Służy do oczyszczenia i odkażenia podłoża przed nałożeniem nowej powłoki malarskiej lub wyprawy tynkarskiej. Do stosowania na wszelkich typowych podłożach budowlanych jak np: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe w tym również, pokrytych powłokami malarskimi. Może być używany zarówno w pomieszczeniach „suchych”, jak i „mokrych” (jak np.: piwnice, suszarnie, łaźnie).

Uwaga: Po zastosowaniu preparatu **ALGIZID W** należy zabezpieczyć oczyszczoną powierzchnię przed ponownym rozwojem glonów i grzybów przez nałożenie farby lub tynku z dodatkiem preparatu **FUNGATIN**.

Dane techniczne:

Bazowe środki aktywne: mieszanina biocydów o działaniu glono- i grzybobójczym;

Gęstość: ok. 1,0 kg/dm³;

Średnie zużycie: ok. 0,15 l/m² (w zależności od chłonności podłoża);

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 1 i 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze powyżej +5°C.

Uwaga: Produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć.

Okres przydatności do stosowania:

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

SPOSÓB UŻYCIA:

Przygotowanie preparatu:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Nie rozcieńczać.

Nanoszenie preparatu:

Preparat nanosić na podłoże pędzlem lub szczotką, starając się równomiernie pokryć całą powierzchnię przeznaczoną do renowacji. Przy silnym skażeniu podłoża zabieg nanoszenia preparatu należy ponownie powtórzyć po 24 godzinach. Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć wodą

Uwaga: Produkt zawiera substancje czynne, chronić oczy i skórę. W trakcie prac należy stosować ubrania robocze. W przypadku wystąpienia kontaktu z oczami natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Wysychanie:

Okres schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy preparatu wynosi ok. 6 godzin (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%). Podczas nanoszenia preparatu powinna występować temperatura powyżej +5°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność mogą powodować wolniejsze wysychanie.

Wskazówki wykonawcze:

Przed zastosowaniem zaleca się wykonać próbę na niewidocznym fragmencie podłoża. Nie stosować na materiałach wrażliwych na działanie rozpuszczalnika.

Uwaga: W przypadku intensywnego porostu glonów i/lub grzybów należy przeprowadzić ocenę techniczną budynku, celem określenia przyczyn i zakresu prac koniecznych do skutecznego usunięcia skażenia biologicznego.