

ALGIZID Z

Preparat do usuwania glonów i grzybów do zastosowań zewnętrznych



Główne zalety:

- Skutecznie usuwa większość występujących w budownictwie glonów i grzybów;
- Posiada szeroki zakres działania;
- Łatwy w aplikacji;
- Bezpieczny w stosowaniu.

Zastosowanie:

Preparat przeznaczony do usuwania porostu glonów i grzybów na powierzchniach występujących na zewnątrz budynków. Służy do oczyszczenia i odkażenia podłoża przed wykonaniem nowej powłoki malarskiej lub wyprawy tynkarskiej. Do stosowania na wszelkich mineralnych podłożach (tj.: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty cementowo-włóknowe), jak i na podłożach pokrytych powłokami lub wyprawami na bazie tworzyw sztucznych. Może być również używany na piankowych płytach izolacyjnych (nie wchodzi z nimi w reakcję).

Uwaga: Po zastosowaniu preparatu **ALGIZID Z** należy zabezpieczyć oczyszczoną powierzchnię przed ponownym rozwojem glonów i grzybów przez nałożenie farby lub tynku z dodatkiem preparatu **FUNGATIN**.

Dane techniczne:

Bazowe środki aktywne: mieszanina biocydów o działaniu glono- i grzybobójczym;

Gęstość: ok. 0,94 kg/dm³;

Zawartość rozpuszczalnika: ok. 30%;

Średnie zużycie: ok. 0,15 l/m² (w zależności od chłonności podłoża);

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 1 i 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze powyżej +5°C.

Uwaga: Produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć.

Okres przydatności do stosowania:

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przygotowanie preparatu:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Nie rozcieńczać.

Nanoszenie preparatu:

Preparat nanosić na podłoże pędzlem lub szczotką starając się równomiernie pokryć całą powierzchnię przeznaczoną do renowacji. Przy silnym skażeniu podłoża zabieg nanoszenia preparatu należy ponownie powtórzyć po 24 godzinach. Bezpośrednio po użyciu, narzędzia umyć wodą.

Uwaga: Produkt zawiera substancje czynne, chronić oczy i skórę. W trakcie prac należy stosować ubrania robocze. W przypadku wystąpienia kontaktu z oczami natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Wysychanie:

Okres schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy preparatu wynosi ok. 6 godzin (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%). Podczas nakładania preparatu powinna występować temperatura powyżej +5°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność mogą powodować wolniejsze wysychanie.

Wskazówki wykonawcze:

Przed zastosowaniem zaleca się wykonać próbę na fragmencie podłoża. Nie należy stosować na materiałach wrażliwych na działanie rozpuszczalnika.

Uwaga: W przypadku intensywnego porostu glonów i/lub grzybów należy przeprowadzić ocenę techniczną budynku, celem indywidualnego określenia zakresu prac koniecznych do skutecznego usunięcia skażenia mikrobiologicznego.